FELINOS

As espécies Extintas



Claudio Campacci



CLAUDIO CAMPACCI

OS FELINOS

As espécies extintas




Claudio Campacci

Primeira Edição – 2023

www.holacv.com

ÍNDICE DE ASSUNTOS

Assunto	Páginas
Felídeos	07
Smilidon Gracilis (Tigre Dente de Sabre)	12
Smilidon Populator (Tigre Dente de Sabre)	14
Smiidon Fatalis (Tigre Dente de Sabre)	16
Dinofelis de Abel	20
Dinofelis Paleoonca	22
Paramachairon Ogygia	23
Promegantereon Ogygia	25
Eusmilus Adelos	28
Tigre Dente de Cimitarra	30
Xenosmilus	34
Maegantereon	36
Leão Moderno	39
Leão do Atlas ou Berbere	40
Leão do Cabo ou Katanga	42
Leão das Cavernas europeu	45
Leopardo de Zanzibar	46
Tigre de Bali	49
Tigre do Cáspio ou Pérsia	52
Tigre de Java	56
Tigre Longdan	59
Leão Americano ou Megaleão	60
Pantera Palaenosinensis	65
Sobre o Autor	67
Outras obras do Autor	68



O S F E L I N O S – As espécies extintas



FELÍDEOS

Felídeos (latim científico: *Felidae*) são uma família de animais mamíferos digitígrados, da ordem dos carnívoros. Existem muitas espécies selvagens, como os grandes felinos. Existem duas subfamílias de felídeos: ***Pantherinae*** (que inclui Tigres, Leões, Ligres, Jaguares, Leopardos, Panteras, Leopardo-das-neves e Leopardos) e ***felíneos*** (que inclui Guepardos, Pumas, Linces, Jaguatiricas, Cervais e Gatos domésticos). Os primeiros exemplares da família surgiram durante o período Oligoceno, há cerca de 25 milhões de anos. Na pré-história, também existia uma terceira subfamília denominada Machairodontinae, em que faziam parte os felídeos dentes-de-sabre como o *Smilodon*. Apesar das semelhanças superficiais, os também extintos *Thylacosmilus* e *Nimravidae* não estão incluídos na família dos felídeos.



Existem atualmente 41 espécies de felídeos. De acordo com cientistas, os felídeos evoluíram no Eoceno a partir do grupo Viverravidae, que também deu origem às civetas, hienas e aos extintos nimravídeos. O primeiro verdadeiro felídeo foi o *Proailurus* (imagem) que viveu na Europa há cerca de 30 milhões de anos, segundo teorias.



Este animal tinha corpo longo, patas curtas e um dente molar adicional em cada mandíbula, por comparação aos

felídeos modernos. Já no Miocénico, o *Proailurus* deu origem ao gênero *Pseudaelurus (imagem)* que se diversificou em dois grupos: a sub-família Machairodontinae, que inclui os Tigres Dente de Sabre e o *Schizailurus*, o ancestral da família dos felídeos, que surgiu há mais de 18 milhões de anos.



O primeiro grupo moderno de felídeos a surgir foi a sub-família Acinonychinae, que inclui as Chitas modernas (género *Acionyx*) e a Chita norte-americana (gênero *Miracionyx*), atualmente extinta.

A sub-família dos felíneos, que agrupa os gatos domésticos, surgiu há cerca de 12 milhões de anos. Os linces surgiram na América do Norte há cerca de 6,7 milhões de anos e daí expandiram-se para a Europa e a Ásia. A primeira espécie reconhecida do género *Lynx* na Europa é o *Lynx Issiodorensis*, que viveu há 4 milhões de anos e era maior que os linces atuais, mas com patas relativamente mais curtas.

Todos os felídeos, sem exceção, são carnívoros obrigatórios. As espécies selvagens são naturalmente solitárias, com algumas exceções como os leões. Gatos domésticos que vivem em condições selvagens também podem formar colônias. Todos os felídeos são normalmente discretos, comumente apresentam hábitos noturnos e gostam de viver em habitats relativamente inacessíveis. No entanto, eles podem ser encontrados em qualquer ambiente e existem espécies conhecidas em quase todos os continentes do planeta, com exceção da região da Australásia e da Antártida.