

Père Jean Tiquet (†)
Charles Bailleul et Pierre Meynet (†)

Espèces arbustives spontanées

**du Burkina-Faso, du Mali
et du Sénégal...**

260 espèces
avec leurs caractéristiques en photos



KARTHALA

Visitez notre site : www.karthala.com

Paiement sécurisé

© Editions Karthala, 2015
(Première édition papier, 2013)
ISBN : 978-2-8111-1302-5

**ESPÈCES ARBUSTIVES SPONTANÉES
DU BURKINA FASO, DU MALI ET DU SÉNÉGAL...**

Père Jean Tiquet (†)

Charles Bailleul et Pierre Meynet (†)

Espèces arbustives spontanées

Du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal...

260 espèces
avec leurs caractéristiques en photos

Éditions KARTHALA
22-24, bd Arago
75013 Paris

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire bambara-français

de Charles Bailleul, P.B, Edition Donniya 2007

Arbres, arbustes et lianes des zones sèches de l'Afrique de l'ouest,

de Michel Arbonnier, Edition Cirad 2002

Arbres du domaine soudanien

de Pascal Cuny, Sidi Sanogo, Nadine Sommer, Edition IER 1997, Mali

Arbres, arbustes et arbrisseaux nourriciers en Afrique occidentale

de Michel Baumer, Edition Enda 1995

Arbres et arbustes guérisseurs des savanes maliennes

de Denis Malgras, P.B, Edition ACCT-Karthala 1992

Arbres de la brousse du Burkina Faso

Collection 'Appui au monde rural' de J.Tiquet P.B, CESA0 1985

Arbres et arbustes du Sahel

de Von Maydell H.J, Edition GTZ 1983

Flore illustrée du Sénégal

de Jean Berhaut, Dakar (1974-1979)

Manuel de botanique forestière d'Afrique tropicale

de Letouzey R., CIFT 1969

Flore forestière Soudano-Guinéenne

d'André Aubréville éd. 1950

Avant- propos historique

Le Père Jean Tiquet (1910-2008), de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), a vécu 22 ans au Burkina-Faso de 1964 à 1986. Grand amoureux de la nature et féru de botanique, il s'est intéressé à l'étude des espèces arbustives spontanées de ce pays, réalisant finalement une collection de 1014 diapositives. Pour chacune de ces 260 espèces, il propose généralement une photo de l'arbre entier, de la feuille, de la fleur et du fruit ou d'une caractéristique particulière. Il se servait de ces diapositives pour illustrer les cours de botanique qu'il donnait à l'école des Eaux et Forêts de Bobo-Dioulasso.

En 1984, il a réalisé plusieurs duplicata de cette collection et nous avons pu en acquérir pour le Centre d'Etudes de Langue bambara (CEL) de Falajè au Mali.

En 2002, il résidait alors dans une de nos maisons de retraite, à Tassy, dans le Var. Lors d'une visite, voyant mon intérêt pour son travail, il me remit spontanément sa collection personnelle ainsi que ses commentaires dactylographiés en disant : 'Toi, tu es jeune (il avait 92 ans et moi 72), ça t'intéresse, tiens, fais-en ce que tu veux'.

Bien que la bibliographie francophone sur les arbres d'Afrique de l'Ouest se soit enrichie en l'an 2002 du magnifique livre illustré et très documenté de Michel Arbonnier, intitulé '**Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'ouest**' ed. CIRAD-MNHN, il nous paraît bon tout de même de publier ce travail de notre aîné sous forme d'album de photos à prix accessible. Une autre raison nous y pousse. Une cinquantaine d'espèces y sont présentées qui ne se trouvent pas dans le livre du CIRAD. De ce point de vue, il en est un complément concernant les espèces spontanées du Burkina-Faso, Mali ou du Sénégal.

L'ouvrage, dans sa présentation, pourrait aussi bien avoir pour titre : '**Comment identifier les espèces arbustives spontanées du Burkina-Faso, du Mali ou du Sénégal**', car l'auteur a eu pour souci principal de signaler les caractéristiques de chaque espèce et de les illustrer par une photo. Tel quel, il devrait intéresser non seulement

- Les professeurs de botanique et leurs élèves.
- Les agents des Eaux et Forêts dont c'est le métier de protéger toutes les espèces, notamment celles en voie d'extinction.
- Les nombreuses ONG qui s'intéressent à la sauvegarde de la Flore arbustive africaine et au reboisement.

mais aussi tous les amoureux de la nature , nationaux ou expatriés, qui aiment connaître les noms scientifiques des plantes et avoir ainsi accès à plus de détails dans d'autres ouvrages. Le commentaire botanique plus complet, rédigé par le Père Tiquet, sera accessible sur le site : **ba-manan.org**

L'auteur avait déjà recherché et relevé le nom éventuel de ces espèces en langue **mooré** à partir des ouvrages du Père Prost et du Père Terrible. J'ai pu moi-même vérifier le nom des espèces sahélo-soudaniennes en langue **bambara**. J'y ai ajouté les noms en langue **wolof** trouvés sur le site *madesahel.enda.sn/html/PlantesList.html*. Il en manque encore un bon nombre ! Pour un meilleur service, n'hésitez pas à nous communiquer ceux dont vous êtes sûrs dans l'une ou l'autre de ces langues. Merci.

Père Charles Bailleul 2012

MODE D'EMPLOI DES ASTÉRISQUES

Les noms scientifiques latins sont tirés du livre de Michel Arbonnier, cité page 5. Le deuxième nom latin marqué d'un astérisque (*) est celui que l'on trouve dans les livres d'André Aubréville ; le nom est plus ancien mais il est souvent cité dans les ouvrages en français.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES FAMILLES ET DES ESPÈCES

- 1/ LANNEA ACIDA (**Anacardiaceae**)
- 2/ LANNEA BARTERI
- 3/ LANNEA MICROCARPA
- 4/ LANNEA VELUTINA
- 5/ OZORIA INSIGNIS / HEERIA INSIGNIS *
- 6/ OZORIA PULCHERRIMA / HEERIA PULCHERRIMA *
- 7/ RHUS ABYSSINICA
- 8/ RHUS INCANA
- 9/ SCLEROCARYA BIRREA / POUPARTIA BIRREA *
- 10/ SORINDEIA JUGLANDIFOLIA
- 11/ SPONDIAS MONBIN
- 12/ ANNONA SENEGALENSIS (**Annonaceae**)
- 13/ HEXALOBUS MONOPETALUS
- 14/ UVARIA CHAMAE
- 15/ XYLOPIA PARVIFLORA
- 16/ ADENIUM OBESUM (**Apocynaceae**)
- 17/ BAISSEA MULTIFLORA
- 18/ HOLARRHENA FLORIBUNDA / HOLARRHENA AFRICANA *
- 19/ LANDOLPHIA HEUDELII
- 20/ RAUWOLFIA VOMITORIA
- 21/ SABA SENEGALENSIS
- 22/ STROPHANTHUS HISPIDUS
- 23/ STROPHANTHUS SARMENTOSUS
- 24/ VOACANGA AFRICANA
- 25/ VOACANGA THOUARSII
- 26/ CUSSONIA ARBOREA (**Araliaceae**)
- 27/ BORASSUS AETHIOPUM (**Arécaceae** / Palmiers *)
- 28/ CALAMUS DEERATUS
- 29/ ELAEIS GUINEENSIS
- 30/ HYPHAENUS THEBAICA
- 31/ RAPHA sp.
- 32/ CALOTROPIS PROCERA (**Asclépiadaceae**)
- 33/ LEPTADENIA HASTATA
- 34/ VERNONIA COLORATA (**Astéraceae** / Composées*)
- 35/ BALANITES AEGYPTIACA (**Balanitaceae** / Simaroubaceae*)
- 36/ KIGELIA AFRICANA (**Bignoniaceae**)
- 37/ STEREOSPERMUM KUNTHIANUM
- 38/ ADANSONIA DIGITATA (**Bombacaceae**)
- 39/ BOMBAX COSTATUM
- 40/ CEIBA PENTANDRA
- 41/ CORDIA MYXA (**Boraginaceae**)
- 42/ BOSWELIA DALZIELII (**Burséraceae**)
- 43/ CANARIUM SCHWEINFURTHII
- 44/ COMMIPHORA AFRICANA
- 45/ COMMIPHORA PEDUNCULATA
- 46/ BOSCIA ANGUSTIFOLIA (**Capparaceae**)
- 47/ BOSCIA SENEGALENSIS
- 48/ CAPPARIS TOMENTOSA / CAPPARIS CORYMBOSA *
- 49/ CRATAEVA ADANSONII / CRATAEVA RELIGIOSA *
- 50/ MAERUA ANGOLENSIS
- 51/ MAERUA CRASSIFOLIA
- 52/ MAYTENUS SENEGALENSIS (**Celastraceae**)
MAYTENUS SENEGALENSIS djalensis
- 53/ AFZELIA AFRICANA (**Césalpiniaceae**)
- 54/ BAUHINIA RUFESCENS parvifolia
- 55/ BERLINIA GRANDIFOLIA
- 56/ BURKEA AFRICANA
- 57/ CASSIA OBOVATA
- 58/ CASSIA PODOCARPA
- 59/ CASSIA SIEBERIANA
- 60/ CORDYLA PINNATA
- 61/ DANIELIA OLIVERI
- 62/ DETARIUM MICROCARPUM
- 63/ DETARIUM SENEGALENSE
- 64/ DIALIUM GUINEENSE
- 65/ ERYTHROPHLEUM AFRICANUM
- 66/ ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS / ERYTHROPHLEUM GUINEENSE *
- 67/ GUIBOURTIA COPALLIFERA
- 68/ ISOBERLINIA DOKA
- 69/ PILIOSTIGMA RETICULATUM / BAUHINIA RETICULATA *
- 70/ PILIOSTIGMA THONNINGII / BAUHINIA THONNINGII *
- 71/ SENNA ALATA / CASSIA ALATA *
- 72/ SENNA SINGUEANA / CASSIA SINGUEANA *
- 73/ SWARTZIA MADAGASCARIENSIS
- 74/ TAMARINDUS INDICA

- 75/ MARANTHES POLYANDRA / PARINARI
P...(Chrysobalanacées)
- 76/ PARINARI CURATELLIFOLIA
- 77/ PARINARI SUBCORDATA
- 78/ ANOGEISSUS LEIOCARPUS
(Combrétacées)
- 79/ COMBRETUM ACULEATUM
- 80/ COMBRETUM COLLINUM hypopilinum
COMBRETUM COLLINUM lamprocarpum
- 81/ COMBRETUM FRAGRANS /
COMBRETUM GHAZALENSE *
- 82/ COMBRETUM GLUTINOSUM
- 83/ COMBRETUM MICRANTHUM
- 84/ COMBRETUM MOLLE /
COMBRETUM VELUTINUM *
- 85/ COMBRETUM NIGRICANS elliotii
- 86/ COMBRETUM PANICULATUM
- 87/ COMBRETUM RACEMOSUM
- 88/ COMBRETUM TOMENTOSUM
- 89/ GUIERA SENEGALENSIS
- 90/ PTELEOPSIS SUBEROSA
- 91/ TERMINALIA ALBIDA
- 92/ TERMINALIA AVICENNOIDES
- 93/ TERMINALIA GLAUDESCENS
- 94/ TERMINALIA LAXIFLORA
- 95/ TERMINALIA MACROPTERA
- 96/ TERMINALIA MOLLIS /
TERMINALIA RETICULATA *
- 97/ SANTALOIDES AFZELII / SANTALOIDES
GUDJUANA * (Connaracées)
- 98/ MONOTHES KERSTINGII
(Diptérocarpacées)
- 99/ DIOSPYROS MESPILIFORMIS
(Ebenacées)
- 100/ MABA LANCEA
- 101/ ERYTHROXYLON EMARGINATUM
(Erythroxylacées)
- 102/ ALCHORNEA CORDIFOLIA
(Euphorbiacées)
- 103/ ANTHOSTEMA SENEGALENSE
- 104/ ANTIDESMA VENOSUM
- 105/ BRIDELIA FERRUGINEA
BRIDELIA FERRUGINEA orientalis
- 106/ BRIDELIA SCLERONEURA /
BRIDELIA TENUIFOLIA *
- 107/ CROTON PSEUDOPULCHELLUS
- 108/ EUPHORBIA POISSONII
- 109/ EUPHORBIA SUDANICA /
EUPHORBIA TRAPAEIFOLIA *
- 110/ FLUEGGEA VIROSA / SECURINEGA
MICROCARPA *
- 111/ MARGARITARIA DISCOIDEA /
PHYLLANTHUS DISCOIDEUS *
- 112/ MICRODESMIS PUBERULA
- 113/ PHYLLANTHUS MUELLERIANUS
- 114/ PHYLLANTHUS RETICULATUS
- 115/ UAPACA ESCULENTA
- 116/ UAPACA TOGOENSIS /
UAPACA SOMON *
- 117/ ABRUS PRECATORIUS
(Fabacées / Papilionacées*)
- 118/ ANDIRA INERMIS
- 119/ BAPHIA BANCOENSIS
- 120/ DALBERGIA MELANOXYLON
- 121/ ERYTHRINA SENEGALENSIS
- 122/ ERYTHRINA SIGMOIDEA
- 123/ FLEMINGIA FAGINEA * /
MOGHANIA FAGINEA
- 124/ LONCHOCARPUS LAXIFLORUS
- 125/ MUCUNA POGGEI
- 126/ PERICOPSIS LAXIFLORA /
AFRORMOSIA LAXIFLORA *
- 127/ PTEROCARPUS ERINACEUS
- 128/ PTEROCARPUS LUCENS
- 129/ PTEROCARPUS SANTALINOIDES
- 130/ SESBANIA SESBAN /
SESBANIA PUNCTATA *
- 131/ XERODERRIS STUHLMANNII /
OSTRYODERRIS CHEVALIERI *
- 132/ FLACOURTIA INDICA / FLACOURTIA
FLAVESCENS (Flacourtiacées)
- 133/ ONCOBA SPINOSA
- 134/ GARCINIA LIVINGSTONII (Guttifères)
- 135/ GARCINIA OVALIFOLIA
- 136/ HARUNGANA MADAGASCARIENSIS
- 137/ PENTADESMA BUTYRACEA
- 138/ PSOROSPERMUM GLABERRIMUM
- 139/ PSOROSPERMUM SENEGALENSE /
PSOROSPERMUM GUINEENSE
- 140/ SALACIA PYRIFORMOIDES
(Hippocratéacées)
- 141/ HYMENOCARDIA ACIDA
(Hyménocardiacées)
- 142/ ANTHOCLEISTA PROCERA /
A. NOBILIS * (Loganiacées)
- 143/ STRYCHNOS INNOCUA
- 144/ STRYCHNOS SPINOSA
- 145/ LAWSONIA INERMIS (Lythracées)
- 146/ MEMECYLON FASCICULARE
(Mélastomatacées)
- 147/ CARAPA PROCERA (Méliacées)
- 148/ EKEBERGIA SENEGALENSIS

- 149/ KHAYA SENEGALENSIS
- 150/ PSEUDOCEDRELA KOTSCHYI
- 151/ TRICHILIA EMETICA
- 152/ ACACIA AMYTHETHOPHYLLA /
A. MACROTHYRSA * (**Mimosacées**)
- 153/ ACACIA ATAXACANTHA
- 154/ ACACIA DUDGEONI /
ACACIA SENEGAL samoryana
- 155/ ACACIA ERYTHROCALYX /
ACACIA PENNATA *
- 156/ ACACIA GOURMAENSIS
- 157/ ACACIA MACROSTACHYA
- 158/ ACACIA NILOTICA /
ACACIA SCORPIOIDES adstringens
- 159/ ACACIA NILOTICA
scorpioides pubescens
- 160/ ACACIA POLYACANTHA campylacantha /
A. CAFFRA campylacantha
- 161/ ACACIA SEYAL
- 162/ ACACIA SIEBERIANA
- 163/ ALBIZZIA CHEVALIERI
- 164/ ALBIZZIA MALACOPHYLLA /
ALBIZZIA BOROMOENSIS *
- 165/ ALBIZZIA ZYGIA
- 166/ DICHROSTACHYS CINEREA /
DICHROSTACHYS GLOMERATA *
- 167/ ENTADA ABYSSINICA
- 168/ ENTADA AFRICANA /
ENTADA SUDANICA *
- 169/ FAIDHERBIA ALBIDA /
ACACIA ALBIDA
- 170/ MIMOSA PIGRA
- 171/ PARKIA BIGLOBOSA
- 172/ PROSOPIS AFRICANA
- 173/ TETRAPLEURA ANDONGENSIS
- 174/ ANTIARIS AFRICANA (**Moracées**)
- 175/ CHLOROPHORA EXCELSA
- 176/ FICUS ABUTIFOLIA /
FICUS KERSTINGII *
- 177/ FICUS CORDATA lecardii /
FICUS LECARDII *
- 178/ FICUS EXASPERATA
- 179/ FICUS GLUMOSA
- 180/ FICUS OVATA
- 181/ FICUS PLATYPHYLLA
- 182/ FICUS SUR / FICUS CAPENSIS *
- 183/ FICUS SYCOMORUS gnaphalocarpa /
FICUS GNAPHALOCARPA *
- 184/ FICUS THONNINGII
- 185/ FICUS TRICHOPODA /
FICUS CONGENSIS *
- 186/ MORINGA OLEIFERA / MORINGA
PTERYGOSPERMA * (**Moringacées**)
- 187/ SYZYGium GUINEENSE guineense
(**Myrtacées**)
SYZYGium GUINEENSE macrocarpum
- 188/ LOPHIRA LANCEOLATA / LOPHIRA
ALATA * (**Ochnacées**)
- 189/ OCHNA AFZELII
- 190/ OCHNA SCHWEINFURTHIANA
- 191/ OURATEA GLABERRIMA
- 192/ OLAX SUBSCORPIOIDES (**Olacacées**)
- 193/ XIMENIA AMERICANA
- 194/ LINOCIERA LINGOLSHEIMIANA
(**Oléacées**)
- 195/ OPILIA CELTIDIFOLIA (**Opiliacées**)
- 196/ PANDANUS sp. (**Pandanacées**)
- 197/ SECURIDACA LONGEPEDUNCULATA
(**Polygalacées**)
- 198/ ZIZIPHUS MAURITIANA (**Rhamnacées**)
- 199/ ZIZIPHUS MUCRONATA
- 200/ BREONADIA SALICINA /
ADINA MICROCEPHALA * (**Rubiacées**)
- 201/ CANTHIUM KRAUSSIOIDES
- 202/ CROSSOPTERYX FEBRIFUGA
- 203/ FADOGIA AGRESTIS
- 204/ FERETIA APODANTHERA / FERETIA
CANTHIOIDES *
- 205/ GARDENIA ERUBESCENS
- 206/ GARDENIA IMPERIALIS
- 207/ GARDENIA SOKOTOENSIS
- 208/ GARDENIA TERNIFOLIA
- 209/ IXORA BRACHYPODA /
IXORA RADIATA *
- 210/ KEETIA CORNELIA / CANTHIUM
CORNELIA *
- 211/ MACROSPHYRA LONGISTYLA
- 212/ MITRAGYNA INERMIS
- 213/ MORELIA SENEGALENSIS
- 214/ MUSSAENDA ARCUATA
- 215/ PAVETTA CORYMBOSA
- 216/ PAVETTA CRASSIPES
- 217/ PAVETTA LASIOCLADA
- 218/ SARCOCEPHALUS LATIFOLIUS /
SARCOCEPHALUS ESCULENTUS *
- 219/ SERICANTHE CHEVALIERI /
TRICALYSIA COFFEIOIDES *
- 220/ TRICALYSIA OKELENSIS
- 221/ TRICALYSIA VIGNEI
- 222/ AFRAEGLE PANICULATA (**Rutacées**)
- 223/ VEPRIS HETEROPHYLLA /
TECLEA SUDANICA *

- | | |
|--|---|
| 224/ ZANTHOXYLUM ZANTHOXYLOIDES /
FAGARA Z. * | 244/ STERCULIA SETIGERA |
| 225/ DISSOMERIA CRENATA (Samydacées) | 245/ STERCULIA TRAGACANTHA |
| 226/ ALLOPHYLLUS AFRICANUS
(Sapindacées) | 246/ DESPLATSIA CHRYSOCHLAMIS
(Tiliacées) |
| 227/ APHANIA SENEGALENSIS | 247/ GREWIA BARTERI |
| 228/ BLIGHIA SAPIDA | 248/ GREWIA BICOLOR |
| 229/ ERIOCOELUM KERSTINGII | 249/ GREWIA CARPINIFOLIA |
| 230/ ERIOCOELUM PUNGENS | 250/ GREWIA CISOIDES |
| 231/ LECANIODISCUS CUPANIOIDES | 251/ GREWIA FLAVESCENS |
| 232/ ZANHA GOLUNGENSIS | 252/ GREWIA LASIODISCUS |
| 233/ MALACANTHA ALNIFOLIA (Sapotacées) | 253/ GREWIA VENUSTA /
GREWIA MOLLIS |
| 234/ MALACANTHA HEUDELLOTIANA | 254/ CELTIS INTEGRIFOLIA (Ulmacées) |
| 235/ MANILKARA MUTINERVIS | 255/ TREMA ORIENTALIS /
TREMA GUINEENSIS |
| 236/ MIMUSOPS KUMMEL | 256/ CLERODENDRON CAPITATUM
(Verbénacées) |
| 237/ PACHYSTELA BREVIPES | 257/ VITEX CHRYSOCARPA |
| 238/ PACHYSTELA POBEGUINIANA | 258/ VITEX DONIANA / VITEX CUNEATA * |
| 239/ NEOBOIVINELLA GLOREMULIFLORA | 259/ VITEX MADIENSIS /
VITEX POBEGUINI * |
| 240/ VITELLARIA PARADOXA /
BUTYROSPERMUM PARKII | 260/ VITEX SIMPLIFOLIA /
VITEX VOGELII * |
| 241/ HANNOA UNDULATA (Simaroubacées) | |
| 242/ COLA CORDIFOLIA (Sterculiacées) | |
| 243/ COLA LAURIFOLIA | |

LANNEA ACIDA * (Anacardiacees)

Moré : sipedga ; Bambara : npèkù(nin)gelen (Lannea-petit-acide) / bèn bèfin (Lannea-noir)
Français : raisinier acide

Habitat : tout le Burkina-Faso.




1



2



3



4



5

- 1/ **arbre** de 4 à 6 m de haut.
- 2/ **écorce** : tranche rouge, fibreuse.
- 3/ **feuille** : imparipennée, 4 à 6 paires de folioles.
- 4/ **les inflorescences** apparaissent avant les feuilles.
- 5/ **fleurs** : racèmes femelles souvent plus courts que les racèmes mâles.
- 6/ **fruits** : baies ovoïdes de 9 à 10 mm.



6

◆ 2 ◆

LANNEA BARTERI * (*Anacardiaceés*)

Habitat : savanes soudano-guinéennes, recherche les lieux humides.



1/ **arbre** : jusqu'à 15 m de haut.

2/ **feuilles** velouteuses dessous, rachis : jusqu'à 70 et 80 cm.

3/ **inflorescence** : racèmes courts.

4/ **fruits** : baies portant 4 petites cornes au sommet, restes des styles.



LANNEA MICROCARPA * (Anacardiacees)

Moré : sabga ; Bambara : npèkùba (*Lannea-grand*) / bènèba (*Lannea-grand*) ; Français : raisinier

Habitat : savanes soudaniennes.



1/ **arbre** : jusqu'à 10 m de haut.

2/ **feuille** : imparipennée, glutineuse dessus.

3/ **base des folioles** dissymétrique.

4/ **inflorescence**.

5/ **fruits** dans l'arbre : 9 à 10 mm de diamètre.

6/ **fruits en vente** au marché.



LANNEA VELUTINA * (Anacardiaceés)

Moré : *sabtulga* ; Bambara : *npèkùbàŋɛɛ* (*Lannea-grand-rugueux*), *bàkòrɔnpɛku* (*bouc-Lannea*), *bènbémuso* (*Lannea-femelle*), *bènbèkuna* (*Lannea-amer*) ; Français : *raisinier velu*

Habitat : savanes soudaniennes.



1/ **petit arbre** ; jeunes feuilles du rouge au jaune avant de verdir, velouteuses sur les 2 faces.

2/ **inflorescence.**



3/ **fruits** dans l'arbre.



4/ **les 4 petites cornes** sont très visibles.



◆ 5 ◆

OZOROA INSIGNIS / HEERIA INSIGNIS * (*Anacardiacees*)

Moré : niinore ; Bambara : kalakari (arc-casser?), kalakaribilen (arc-casser?rouge)
Wolof : woswosor

Habitat : savanes boisées soudano-guinéennes.



1/ **arbre** de 4 à 6 m de haut.



2/ **rameau** : feuilles verticillées par 3, vertes dessus, blanches argentées dessous.



3/ **inflorescence** : panicule terminal de 7 à 15 cm.

4/ **infrutescence**.

5/ **fruit** : baie aplatie, réniforme, luisante.



OZOROA PULCHERRIMA / HEERIA PULCHERRIMA * (*Anacardiaceés*)

Habitat : savanes boisées soudano-guinéennes.



- 1/ **rameau** : verticille de 3 feuilles.
- 2/ **feuilles** : argentées dessous.
Une trentaine de nervures
parallèles, très saillantes dessous.



RHUS ABYSSINICA * (*Anacardiacees*)

Habitat : savanes, endroits humides, rochers, ravins.



1/ **gros buisson**. Feuille trifoliée, glabre et non crénelée.

2/ **inflorescence** axillaire branchue.

3/ **fruit** : drupe de 4 à 5 mm de diamètre.



RHUS INCANA * (*Anacardiaceés*)

Habitat : savanes.



1/ **folioles** crénelées de 3 à 7 cm sur 1,5 à 3,5.

2/ **inflorescence** : non branchue, couverte de longs poils comme le pétiole et toute la plante.



SCLEROCARYA BIRREA / POUPARTIA BIRREA * (Anacardiacees)

Moré : noabga ; Bambara : nkùnan Wolof : beer ; Français : prunier cornu

Habitat : du Sahel à la forêt humide.



- 1/ **arbre** de 10 à 12 m de haut.
- 2/ **feuille** : 7 à 10 paires de folioles très polymorphes.
- 3/ **fructification** : avant la feuillaison.
- 4/ **début de végétation** avec feuilles et fruits.
- 5/ **fruits** : drupes ovoïdes jaunes de 3 à 3,5 cm de diamètre. Comestible. Sert à fabriquer une boisson fermentée.



SORINDEIA JUGLANDIFOLIA * (*Anacardiaceés*)

Habitat : du Sahel à la forêt humide.



1/ **arbuste** jusqu'à 5 m de haut, parfois lianescent. Rameau ligneux.



2/ **feuille** : rachis de 40 cm.

3/ **foliole** : remarquer la nervure plus faible qui fait bissectrice de l'angle entre la nervure centrale et une nervure secondaire.



4/ **inflorescence** : de 15 à 40 cm.

5/ **fruits** pendant dans l'arbre : drupes jaunes-orangées ou violettes de 1 à 1,5 cm.



SPONDIAS MONBIN * (*Anacardiacees*)

Bambara : minkon ; Français : prunier mombin

Habitat : parfois sub-spontané, en zone soudano-guinéenne.



1/ **arbre des Antilles**, multiplié pour ses fruits.

2/ **écorce** profondément crevassée aux arêtes longitudinales épaisses et rugueuses.

3/ sommet d'une feuille : 8 paires de **folioles** inégales, plus une terminale plus petite.



◆ 12 ◆

ANNONA SENEGALENSIS * (Annonacées)

Moré : barkudga ; Bambara : dâgânnin (dâgan-petit), dũgũmâdagannin (près du sol-dagan-petit),
mândênsunsun (mandé-annone) ; Français : annone du Sénégal

Habitat : de la zone guinéenne jusqu'au Sahel.



1/ **fleur** pendante, en clochette.

2/ **fleur** vue par-dessous + feuilles alternes.

3/ **cœur** de la fleur.

4/ **fruits verts**, pendants.

5/ **fruit mûr**.

6/ **coupe du fruit**.



◆ 13 ◆

HEXALOBUS MONOPETALUS * (*Annonacées*)

Bambara : *ncafa* / *nfuganinjè*

Habitat : savanes soudano-guinéennes.



1/ **petit arbre** (5m de haut), ici dans la falaise près de Bobo-Dioulasso.

2/ **feuilles jeunes**, encore soyeuses.

3/ **boutons floraux**.

4/ **fleur** épanouie.

5/ **fruit vert**, complet.

6/ **fruits mûrs**.



UVARIA CHAMAE * (*Annonacées*)

Habitat : savanes soudano-guinéennes, galeries forestières.



1/ **fleur** ... arbuste lianescent.

2/ **fruits.**



3/ **section** du fruit.

4/ **feuilles** (identification difficile sans fleurs ou fruits).



XYLOPIA PARVIFLORA * (*Annonacées*)

Bambara : *nkaani*

Habitat : galeries forestières des zones soudano-guinéennes.



1/ **feuilles alternes** ... arbuste
lianescent.

2/ **face inférieure du limbe** : terne.

3/ **fleurs** par 2 ou 3 à l'aisselle
des feuilles.

4/ **détail de la fleur** : corolles
à 6 pétales étroits, sauf à la base.



ADENIUM OBESUM (Apocynacées)

Bambara : kungonsirànin (petit baobab de brousse) ; Français : baobab du chacal

Habitat : Sahel et zone soudanienne, dans des sols pierreux.



1/ **arbuste** effeuillé.



2/ **floraison** : première moitié de saison sèche.

3/ **fleurs** de près.

4/ **arbuste** en feuilles.



BAISSEA MULTIFLORA * (Apocynacées)

Bambara : *tutonota* (fourré-lianescent) ; *Français* : *liane-étoile*

Habitat : galeries ou bords de ravin en zone guinéenne.



1/ **buisson ou arbuste** lianescent, fleurissant au début de saison sèche.

2/ **fleur** : corolle de 10 mm.



3/ **fruit** : siliques linéaires de 25 à 50 cm, contenant des graines, munies d'une aigrette.

