

DROGAS E DOSES

CUIDADO!

Você pode matar ou adoecer grave mente seu animal de estimação!

Esta lista é somente para protetores ou pessoas idoneas. A doses vai de acordo com o peso e também deve-se ter conhecimento das contraindicações. Por favor consulte um veterinário, as possibilidades de erro são muito grandes para quem não têm a devida experiência. Para quem é idoneo, não esqueça de ler a bula do medicamento.

Algumas das abreviações feitas em "Drogas e Doses"

SID	significa que você deve tomar a medicação 1 vez ao dia
BID	significa que você deve tomar a medicação 2 vezes ao dia, em intervalos regulares
TID	significa que você deve tomar a medicação 3 vezes ao dia, em intervalos regulares
QID	significa que você deve tomar a medicação 4 vezes ao dia, em intervalos regulares

A sigla vem do latim, por exemplo: QID significa "Quater in die", QD = "quaque die", TID = "ter in die", E finalmente BID = "bis in die".

Poderá também estar escrito da seguinte forma: q8h, q12h, q4h; o número entre as letras que dizer o intervalo entre as dose, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, etc

Relação de Medidas

1 colher de café	3 ml
1 colher de chá	5 ml
1 colher de sobremesa	15 ml
1 colher de sopa	25 ml

A

Droga	Indicação	Caninos	Felinos
Acepromazina (Acepran pet)	Neuroplégico-tranquilizante. Usado nos casos que requeiram um efeito tranquilizante para obter um estado de indiferença a estímulos excitantes ao redor do animal.	1 a 3 gotas/kg via oral efeito inicia 3045 minutos depois. Para Eutanásia 0,1-0,2 mg/kg	1 a 3 gotas/kg via oral efeito inicia 3045 minutos depois. Para Eutanásia 0,1-0,2 mg/kg
Acetaminofen	Analgésico leve sem propriedades anti-inflatorias	10mg/kg/12 horas oral	Não
Acetato de desmopressina	Anti-diurpético reduz a eliminação de água do	1 gota/8 horas nasal	Não estabelecida

	organismo		
Acetato de megestrol	No tratamento da acentuada perda de peso devido a anorexia e caquexia em portadores de aids e câncer	Pele: 1 mg/kg/dia/oral Comportamento: 2-4 mg/kg/dia; reduzir a metade aos 8 dias para manutenção. Em proestro: 2 mg/kg/dia/oral durante 8 dias. Em anestro: 0,5mg/kg/dia/oral durante 32 dias. Pseudo prenhez: 2mg/kg/dia/oral durante 8 dias	Pele:5mg/dia/oral 7dias, depois 2 vezes por semana (ter precaução) Comportamento: 2-4mg/kg/dia; reduzir a metade aos 8 dias para (possíveis efeitos colaterais sérios).
Acetato de metilprednisolona (Depo-medrol)	Corticoide	1mg/kg 1 ou 3 vezes por semana/ IM-SC. Trauma no SNC: 10 mg/kg TID-IM	1mg/kg 1 ou 3 vezes por semana/ IM-SC. Trauma no SNC: 10 mg/kg TID-IM Granuloma eosinofílico 0,5 ml/gato (20 mg) em dose única ou 2 doses com intervalo de 15 dias
Acetato de prednisolona (Pred-fort)	Inflamação da conjuntiva bulbar e palpebral, nas inflamações de córnea e segmento anterior do globo, susceptíveis a esteroides.	Uveíte: 1 gota, <i>QID</i> a 5 vezes/dia.	Uveíte: 1 gota, <i>QID</i> a 5 vezes/dia.
Acetazolamida	Hidrocefalia, glaucoma.	10 mg/kg/6 horas oral durante 21 dias	Não
Acetilcisteína (Fluimicil)	Indicado em bronquites, enfisemas, otites catarrais, sinusites; têm ação mucolítica, antioxidante, e pneumo protetora.	Diluir até 2% de solução de lágrimas artificiais, aplicar cada 2 horas no olho pelo máximo de 48 hs. Respiratório: 50 ml/hora durante 30-60 minutos cada 12 horas mediante nebulização. Intoxicação com acetaminofen: 140 mg/kg, bucal, IV (doses de ataque), após 70 mg/kg/4 horas 4-5 tratamentos.	Diluir até 2% de solução de lágrimas artificiais, aplicar cada 2 horas no olho pelo máximo de 48 hs. Respiratório: 50 ml/hora durante 30-60 minutos cada 12 horas mediante nebulização. Intoxicação com acetaminofen: 140 mg/kg, bucal, IV (doses de ataque), após 70 mg/kg/4 horas 4-5 tratamentos.
Acetil-promazina	Potente tranqüilizante fenotiazínico produzindo depressão no sistema nervoso com supressão do sistema nervoso simpático.	0,055-0,11mg/kg/IV/IM/SC; 0,55-2,2 mg/kg oral	0,055-0,11mg/kg/IM/SC; 1,1-2,2 mg/kg/oral

Acido acético 2%	Otites causadas por Pseudomonas. Não usar se houver hemácias na lâmina.	A critério médico	A critério médico
Acido acetilsalicílico	Analgésico e afinador do sangue	Analgesia: 10 mg/kg/12 horas oral Antirreumático: 40 mg/kg/18 horas oral o 25 mg/kg/8 horas	Analgesia: 10 mg/kg cada 52 horas oral Antirreumático: 40 mg/kg/72 horas oral
Acido aceto-hidroxi-lamínico		10-15 mg/kg/12 horas oral	Não
Acido ascórbico (vitamina c)	Aumenta Imunidade Acidificante urinário	200-500 mg/8horas manter 200-500 mg/dia	200-500 mg/8horas manter 200-500 mg/dia
Acido épsilon-aminocapróico (Ipsilon)	Hemorragia	100mg/kg TID, durante 5 dias	100mg/kg TID, durante 5 dias
Acido fólico	É a vitamina B9 ou M, necessária para formar proteínas estruturais e hemoglobina. Efetivo no tratamento de certas anemias	5 mg/dia/oral	2,5 mg/dia/oral
Acido fusídico creme 2% (Verutex)	Infecções de pele causadas por estafilococos, estreptococos, furúnculos, foliculites	Aplicar durante 7 dias	Não
ácido gama-aminobutírico	Acelerador no metabolismo cerebral, melhora aprendizado, em casos de coma induzido por AVC, trauma, diabete, eclampsia, hepatopatias	5 ml BID por 10 a 15 dias	5 ml BID por 10 a 15 dias
Acido mucopolissacarídeo-polissulfurico (Hirudoid pomada)	Inflamações localizadas, flebites, trombozes, hematomas, mastites, furúnculos	Espalhar o produto aplicando leve fricção	Espalhar o produto aplicando leve fricção
Acido nalidíxico	Bactericida para germes Gram - do trato urinário, como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter (sp)	3 mg/kg/6 horas oral	3 mg/kg/6 horas oral
Acido Pipemídico (Pipuirol)	infecção das vias urinárias	no homem: 15 a 40 mg/kg - BID	no homem: 15 a 40 mg/kg - BID
Acido poliacrílico	Gel substituto da película lacrimal síndrome da secura ocular	Colocação tópica	Colocação tópica
Acido valproico		60 mg/kg/8 horas oral	No estabelecida

Acido tranexâmico (Transamin)	Anti-hemorrágico em casos decorrentes de hiper fibrinólise	dose empírica, 1 ampola/6kg ou 1 comprimido TID 5 dias.	dose empírica, 1 ampola/6kg ou 1 comprimido TID 5 dias.
Acido ursodesoxicólico (ursacol)	Protetor hepático	5 a 10 mg/kg, BID ou 15mg/kg TID	>5mg/kg BID
ACTH	Síndrome de Cushing adenoma ou carcinoma, hiperplasia adrenocortical, síndrome ACTH, casos não operáveis	2U/kg/dia IM	2U/kg/dia IM
Actinomicina D	antibiótico antineoplásico Ele atua inibindo a multiplicação das células danificadas. Câncer, sarcomas, tumor de Wilms e trofoblástico.	0,015mg/kg cada 3-5 dias EV, aguardar 3 semanas para recuperatório medular, 1,5 mg/m ² 1 vez/semana	0,015mg/kg cada 3-5 dias EV, aguardar 3 semanas para recuperatório medular, 1,5 mg/m ² 1 vez/semana
Agasten (Fumarato de clemastina)	anti-histamínico	0,05mg/kg- BID/VO	sem dados
Albendazol	Vermifugo	25 mg/kg/24 horas oral por 4 a 5 dias.	30 a 50 mg/kg dose única repetir aos 15 dias - 3 dias consecutivos
Alopurinol	tratamento da hiperuricemia da gota e distúrbios hematológicos ou terapia antineoplásica.	10mg/kg/8 horas oral	No estabelecida
Amicacina	infecções, gram-negativos e outros. brucelose, cistite, endocardites, endometrites, gastroenterites, listerioses, meningites, peritonites, pneumonia, septicemia, etc.	5mg/kg/6-8 horas EV,IM,SC	5mg/kg/6-8 horas EV,IM,SC
Aminaftona (Capilarema)	Circulação, perturbações das funções dos capilares	TID, por 5 dias	TID, por 5 dias
Aminofilina	Broncodilatador	10mg/kg/12 horas oral	5mg/kg/12 horas oral
Amitraz (triatrox pet)	Sarna, carrapatos e piolhos	20 ml em 10 litros de água ou 4ml em 1 litro de água. Aplicar 3 a 6 vezes cada 14 dias	Não
Amitriptilina	Antidepressivo tricíclico.	1-2mg/kg/dia oral	5-10mg total/dia/oral
Amoxicilina	Antibiótico para as vias respiratórias	11 mg/kg/12 horas Oral - IV-IM-SC	11mg/kg/12 horas Oral - IV-IM-SC
Amoxicilina com clavulanato de potássio (Clavulin - Synulox)	bactericida, infecções do trato respiratório, geniturinário, ossos,	12,5-25 mg/kg/24 horas oral	62mg/kg/24 horas oral

	articulações, pele, tecido moles, etc.		
Ampicilina	Antibiótico	10-20mg/kg/6 horas oral 5-10 mg/kg/6 horas IV,IM	10-20mg/kg/6 horas oral 5-10 mg/kg/6 horas IV,IM
Ampicilina Benzatina e Ampicilina Sódica (Optacilin)	antibiótico. É bactericida, age sobre microorganismos gram+ e gram-.	10-20 mg/kg, IV, IM, SC TID ou QID	10-20 mg/kg, IV, IM, SC TID ou QID
Amprolium	Anti-parasitário, Isospora em cães e gatos, Eimeria em bovinos e aves.	110-220mg/kg/dia c/la comida	Sem dados
Ancylex (nitrofenol - disophenol)	Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense, Uncinaria stenocephala, Spirocerca lupi	1ml/5kg SC. Em cães menores de 5kg usar seringa com fracionada	Não
Anfetamina	estimulantes do sistema nervoso central	4,4mg/kg EV, IM	Idem
Anfotericina	antifúngico, antiprotozoário. Aspergilose, blastomicose, candidíase, coccidioidomicose, criptococose, histoplasmoze, mucormicose, esporotricose disseminada, leishmaniose.	0,15-0,5mg/kg/dia EV dia por meio	0,15-0,5mg/kg/dia EV dia por meio
Antak (Cloridrato de ranitidina)	Indicado para úlceras gastro-duodenais, azia.	2 mg/kg- TID,IV, VO	2,5 mg/kg BID,IV ou 3,5 mg/kg- BID, VO
Antitoxina tetânica	Contra o tétano	100-500U/kg, máximo 20.000 U (prova inicial de 0,1ml-0,2ml SC 15-30 minutos antes de la doses iV)	100-500U/kg, máximo 20.000 U (prova inicial de 0,1ml-0,2ml SC 15-30 minutos antes de la doses iV)
Apomorfina	Para induzir vômito terapêutico em caninos que recentemente ingeriram substâncias tóxicas ou estranhas.	0,08 mg/kg Una vez EV,IM	Não
Arecolina	Estimulante ganglionar, parassimpatomimético e vermífugo	5mg/kg Una vez oral	5mg/kg Una vez oral
Artroglycan (composto natural de condroitin-4-sulfato e condroitin-6=sulfato glicosaminoglicanos)	artropatias, patologias tendíneas, patologias osteoarticulares, osteodistrofia e condrodistrofias e	até 10kg: 1ml SC, IM ou 1 comp/dia de 10-25 kg: 2 ml SC, IM ou 2 comp/dia >25 kg: 2,5ml SC, IM ou	Sem dados

monossulfatados)	reparação de fraturas, displasia coxofemoral	3 comp/dia Intervalo de aplicação SC, 4 a 7 dias *No 1º mês: SC no 2º mês, fazer VO	
Ascaridil	Levamisole	Imunoestimulante: 0,5-2 mg/kg 3x/sem VO - Parasitas: 7,5 mg/kg VO dose única	Imunoestimulante: 0,5-2 mg/kg 3x/sem VO - Parasitas: 4,4 mg/kg VO Dose única
Astemizol (Hismanal)	Alergias responsivas aos anti-histamínicos incluindo urticárias, rinite, conjuntivite alérgica	0,2mg/kg/dia VO	0,2mg/kg/dia VO
Atenol (atenolol)	Indicado no controle da hipertensão arterial, das arritmias cardíacas, tratamento do infarto do miocárdio, VPC's, contração ventricular prema., cardiomiopatia hipertrófica.	Para hipertensão: 2 mg/kg- SID/VO	Para hipertensão: 2 mg/kg- SID/VO
Atropina	Indicado em bradicardia sinusal, bloqueio átrio-ventricular e parada cardíaca. Broncoconstritor nos enfisemas. Antiespasmódico	0,04 mg/kg/6 horas IV,SC Se intoxicação por organofosforado ou carbamato: 0,2 a 0,5 mg/kg	0,04 mg/kg/6 horas EV,SC Se intoxicação por organofosforado ou carbamato: 0,2 a 0,5 mg/kg
Aurivet (gentamicina, cetoconazol, betametazona, lidocaína)	Infecções do ouvido. A gentamicina é muito boa para leveduras, a Lidocaína tópica não funciona.	a critério médico	a critério médico
Azatioprina	Imunossupressor	2mg/kg/diaSID, VO inicialmente e depois 0,5 a 1mg/kg cada 48horas	1,5-3mg/kg/cada 48 horas. O uso é desaconselhável.
Azeite de Castor	Complemento alimentar	8-30ml Oral	4-10ml Oral
Azeite de fígado de Bacalhau	Complemento alimentar	1 colherzinha/10kg/dia/oral	1 colherzinha/10kg/dia/oral
Azitromicina	Infecções respiratórias, de pele, Toxoplasmose, Borreliose, oftálmicas, genito-urinárias, respiratórias, Otites	10mg/Kg x3-7/dias SID 30mg/kg VO 48 horas Protocolo: 1 doses a los 30-33-45 dias de vida.	10mg/Kg x3-7/dias SID
Azt	Aids felina	Não	5mg/kg, BID-VO ou 10mg/kg, SID-VO

Azium (dexametasona)	dermatoses, reumatismos, artrites, doenças alérgicas, stress, pneumonia grave.	0,25 a 1 mg/kg IV, IM BID SID Choque: 2-5mg/kg IV Antinflamatória: 0,1 a 0,2 mg/kg BID, SID	0,12 a 0,5 mg/kg IV, IM BID SID. Choque: 2-5 mg/kg IV Antinflamatória: 0,1 a 0,2 mg/kg BID, SID
---------------------------------	---	---	---

B

Droga	Indicação	Caninos	Felinos
Bactrim - Borgal (Sulfametazol e trimetoprim)	infecções do trato urinário, genital, atravessa barreiras hemato-encefálicas	30 mg/kg SID - SC, VO ou 15mg/kg BID - IM,VO Toxoplasmose:30 mg/kg cada 12h VO	30 mg/kg SID - SC, VO ou 15mg/kg BID - IM,VO Toxoplasmose:30 mg/kg cada 12h VO
Banamine (flunixin meglumine)	analgésico, não esteróide, c/atividade antiinflamatória, antipirética.Dor, febre, e/ou inflamação	1,1 mg/kg IV, IM, SC ou 1,1 mg/kg/dia por 3 dias VO BID, TID por 3 dias	1,1 mg/kg IV, IM, SC ou 1,1 mg/kg/dia por 3 dias VO BID, TID por 3 dias
Baypamun DC (polygeline e parapoxivirus ovino inativado quimicamente)	Na profilaxia e adjuvante das doenças infecciosas dos cães e gatos, através do estímulo dos mecanismos de defesa do organismo	Como profilaxia: 2 dias antes do stress, até 5 dias após o stress. Como tratamento: 7 dias após exposição à infecção.	Sem dados
Baytril - Flotril - Enropet (enrofloxacina)	antibiótico. Não deve ser usado em cães menores de 8 meses e em gatos menores que 2 meses.	5 a 10 mg/ml	5 a 10 mg/ml
Belacodid (codeína, citrato de fenetilamina, pentetrazol)	calmante das tosse reflexas, quintosas e espasmódicas, nas laringites, traqueítes, faringites, mucosas e secreções catarrais.	0,1 a 0,3 mg/kg cada 6 a 8 horas VO	0,1 a 0,3 mg/kg cada 6 a 8 horas VO
Bendroflumetiazina	Diurético, antiulolitiásico e anti-hipertensivo.	0,2-0,4 mg/kg 1 vez por dia oral	0,2-0,4 mg/kg 1 vez por dia oral
Benflogin - Benzitrat (cloridrato de benzidamida)	analgésico e antiinflamatório	1 gota/kg TID por 4 a 5 dias ou 50mg/animal BID	1 gota/kg BID por 4 a 5 dias ou 50mg/gato BID
Benzoato de estradiol	indução e sincronização deaios	0,1 mg/kg uma vez IM	0,25-0,5 mg uma vez IM
Betametasona (Betnovate)	Corticoide	TID - tópico - 0,1 a 0,2 mg/kg BID ou SID VO (se for solução)	TID - tópico - 0,1 a 0,2 mg/kg BID ou SID VO (se for solução)
Betametasona e Gentamicina (Diprogenta)	Dermatite, atópica, eczema, intertrigo, disidrose, dermatite seborreica.	BID ou TID	BID ou TID

Betanecol	Diurético, retenção urinária em pós-operatório, parto, e da causada pela atonia neurogênica da bexiga.	5-25 mg/8 horas oral	2.5mg-5mg/8 horas oral
Betnovate (Betametasona)	Corticoide	TID - tópico - 0,1 a 0,2 mg/kg BID ou SID VO (se for solução)	TID - tópico - 0,1 a 0,2 mg/kg BID ou SID VO (se for solução)
Bicarbonato de sodio	Para acidose metabólica, cálculos renais, diarreia.	50 mg/kg/8-12hs VO (1 colherzinha de pó equivale a 2 g) 1 mEq/kg IV imediata, añadir 3 mEq ao goteio	50 mg/kg/8-12hs VO (1 colherzinha de pó equivale a 2 g) 1 mEq/kg IV imediata, añadir 3 mEq ao goteio
Biamotil (ciprofloxacina)	Infecção ocular, úlcera de córnea por Pseudomonas, S. aureus, Streptococcus,	Usp:KCS: 1 gota, 6 vezes/dia KCS + Úlcera: 1 gota, BID. pomada- aplicar no saco conjuntival 3 a 4 vezes ao dia;	Usp: KCS: 1 gota, 6 vezes/dia KCS + Úlcera: 1 gota, BID. pomada- aplicar no saco conjuntival 3 a 4 vezes ao dia;
Bismuto (subnitrato, subgalato o subcarbonato)	Para tratar a diarreia, aliviar os sintomas de dor de estômago, como azia, indigestão e náuseas.	0,3-3 g/4 horas oral	0,3-3 g/4 horas oral
Bismuto, leite de	Diarreias	10-30 ml/4 horas oral	La mitad de la dosis
Bleomicina	Antibiótico antineoplásico. Câncer de células escamosas, linfoma.	10mg/m2/día EV o SC durante 4 días, luego 10 mg/m2/semana hasta una dosis total máxima de 200 mg/m2	10mg/m2/día EV o SC durante 4 días, luego 10 mg/m2/semana hasta una dosis total máxima de 200 mg/m2
Borgal - Bactrim (Sulfametazol e trimetoprim)	infecções do trato urinário, genital, atravessa barreiras hemato-encefálicas	30 mg/kg SID - SC, VO ou 15mg/kg BID - IM,VO Toxoplasmose:30 mg/kg cada 12h VO	30 mg/kg SID - SC, VO ou 15mg/kg BID - IM,VO Toxoplasmose:30 mg/kg cada 12h VO
Brometo de Rocurônio (Esmeron)	Bloqueador neuromuscular	0,05 mg/kg (0,02 mg/kg é suficiente para um bloqueio de 1 hora)	0,05 mg/kg (0,02 mg/kg é suficiente para um bloqueio de 1 hora)
Bromosulfonftaleína (solución al 5 %)		Sólo estudio: 5mg/kg IV; mostra após 30 minutos	Não
Bunamidina	Cestocida	25-50 mg/kg oral. Ayuno 3 horas antes y después de administración	25-50 mg/kg oral. Ayuno 3 horas antes y después de administración
Buscopan (Hioscina e dipirona)	espasmolítico, analgésico, antipirético	1 ml/5 kg ou 1 gota/kg BID 1 a 2,5 ml	1 ml/5 kg ou 1 gota/kg BID 0,5 a 1 ml
Busulfano	É um citotóxicos”, utilizados como parte de	4 mg/m2/día oral; 0,1 mg/kg/día	Não

	um tratamento de “quimioterapia”		
Butorfanol	analgésico opioide	0,055-0,11 mg/kg/6-12 horas SC hasta 7 días; 0,55 mg/kg/6-12 horas oral	Não
Butox (deltametrina)	Carrapaticida para uso em banheiro. Eficiente contra todas cepas de carrapatos	diluição 1:2000. Banho 1amp/30l água Ambiente - 1 amp/20l. água	Não

C

Droga	Indicação	Caninos	Felinos
Cafeína		0,1-0,5 g IM	Não
Cal sulfurada	Dermatofitose	Solución al 3 %, baño 1 vez/semana durante 4-6 semanas, dejar secar.	Solución al 3 %, baño 1 vez/semana durante 4-6 semanas, dejar secar.
Calcio Na2 EDTA		100 mg/día/SC x 2-5 días; dosis diaria dividida en 4 partes iguales después de dilución aproximada de 10 mg CaNa2 EDTA/ml de dextrosa al 5 %	100 mg/día/SC x 2-5 días; dosis diaria dividida en 4 partes iguales después de dilución aproximada de 10 mg CaNa2 EDTA/ml de dextrosa al 5 %
Calcitonina	Doença óssea de Paget, osteoporose, para prevenir a perda progressiva de massa óssea.	4-8 UI/kg/12 horas IM	Não
Canesten (clotrimazol)	antimicótico de uso tópico	Aplicar BID ou TID dermatomicoses: 3 a 4 semanas	Aplicar BID ou TID cuidado dermatomicoses: 3 a 4 semanas
Caolín e Pectina	Anti-diarreico	1-2 ml/kg/6 horas oral	1-2 ml/kg/6 horas oral
Capilarema (aminaftona)	Circulação, perturbações das funções dos capilares	TID, por 5 dias	TID, por 5 dias
Capstar	Para pulgas e carrapatos. Depois de 2hs mata as pulgas que estejam no animal. Dura 24hs	<11,4kg = 1 comp/1,4mg SID 5 dias 11,4-57kg = 1 comp/57mg SID 5 dias	1 comp de 11,4 mg, SID – 5 dias
Captan	Funguicida	0,2-0,25% solución tópica, 2-3 veces por semana	0,2-0,25% solución tópica, 2-3 veces por semana
Captopril	Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva.	0,5-2 mg/kg/8-12 horas oral	2 mg/kg/8-12 horas oral
Carbenicilina	Infecções graves,	15 mg/kg/8 horas EV	15 mg/kg/8 horas EV

	hospitalares, geniturinária, abdominal, obstétrica, óssea, queimaduras severas.		
Carbonato de Calcio (Casca de ovo triturada)	Osteodistrofia, hipocalcemia	1-4 g/día/oral 1 colher chá na comida, BID, 30 dias.	1-4 g/día/oral 1 colher chá na comida, BID, 30 dias.
Cardomec - Ivomec (ivermectina)	Nematódeos, sarnas, pulgas, carrapatos, dirofilariose	0,02ml/kg (200 a 300 microgramas/kg SC, IM ou VO) – 2 aplicações a cada 15 dias.	0,03 mg/kg, SC
Carprofeno (Rimadyl pet)	alívio da dor e inflamação em cães. Eficaz no alívio de sinais de osteoartrite.	2,2 mg/kg BID por 14 dias	Sem dados
Carvão ativado	Intoxicações e diarreias	0,3-5g/8-12 horas oral Intoxicación: 1-2 colherzinhas ou 1-1,5 kg em 20 ml de agua corrente; administrar mediante tubo estomacal	0,3-5g/8-12 horas oral Intoxicación: 1-2 colherzinhas ou 1-1,5 kg em 20 ml de agua corrente; administrar mediante tubo estomacal
Cáscara sagrada (extracto)	Laxante natural	1-4 ml Según circunst.	Idem
Cefadroxil	Antibiótico, infecções causadas por microorganismos sensíveis.	22 mg/kg/12 horas oral	22 mg/kg/día oral
Cefalexina (Keflex - Rilexine)	Antibiótico	10-30mg/kg – BID ouTID - VO	10-30mg/kg – BID ouTID VO
Cefalin - Keflin (Cefalotina)	antibiótico	10 a 30 mg/kg cada 4 a 8 horas, IM ou IV	10 a 30 mg/kg cada 4 a 8 horas, IM ou IV
Cefalotina (Cefalin - Keflin)	antibiótico	10 a 30 mg/kg cada 4 a 8 horas, IM ou IV	10 a 30 mg/kg cada 4 a 8 horas, IM ou IV
Cefalotina sódica	Antibiótico	22-44 mg/kg/6-8 horas IM, EV	22-44 mg/kg/6-8 horas IM, EV
Cefapirina	Antibiótico	10-20 mg/kg/6 horas IM, EV	10-20 mg/kg/6 horas IM, EV
Cefazolina (Kefazol)	antibiótico para osteomielite	10-30mg/kg cada 4 a 8 horas, IM, IV 22mg/kg - IV TID para peritonite.	10-30mg/kg cada 4 a 8 horas, IM, IV 22mg/kg - IV TID para peritonite.
Cefoxitina sódica (Mefoxin)	antibiótico bactericida de amplo espectro, indicado para peritonites, septicemias, infecções ginecológicas, endocardites, infecções	15 a 30 mg/kg cada 6 a 8 horas, IV	15 a 30 mg/kg cada 6 a 8 horas, IV